

Педикулёз – специфическое паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью.

Многие ошибочно считают эту болезнь уделом низших слоев общества, пренебрегающих элементарной гигиеной, но подхватить этих паразитов может абсолютно каждый.

Как правило, навредить человеку могут три вида вшей:

1. Головная вошь;
2. Платяная вошь;
3. Лобковая вошь.

Самым распространенным видом вшей считается головная вошь, которая поселяется на волосистой части головы. Предпочтение отдает затылочной и височной частям. Питается такая вошь в основном человеческой кровью, чем приносит огромный дискомфорт своему «хозяину».

Внешне этот паразит имеет очень скромные размеры и почти прозрачное тельце. Но вся проблема состоит в том, что эти непрошеные гости очень быстро размножаются. Таким образом, одна самка живет до месяца и успевает отложить до 10 яиц в день. Так называемые гниды (яйца вшей) крепятся к человеческому волосу специальным клейким веществом.



Челюсти головной вши с легкостью прокусывают кожу, выделяя в ранку специальный секрет, который обладает раздражающим действием и вызывает нестерпимый зуд.

Заражение людей вшами происходит при контакте с завшивленными лицами в организованном коллективе, местах скопления людей (транспорт, бассейны, сауны, прачечные, парикмахерские), при совместном проживании в семье, квартире (использование общих расчесок, щеток, постельных принадлежностей, одежды и т.д.).

В детском коллективе, передача насекомых может происходить через мягкие игрушки или постельное белье.

Невозможно заразиться вшами от животных, так как эти паразиты видоспецифичны, то есть человеческие вши могут жить только на человеке.

Основными симптомами педикулеза являются зуд, сопровождающийся расчесами. Расчески нередко способствуют возникновению вторичных кожных заболеваний: гнойничковых поражений, дерматитов, пигментации кожи, экземы, у некоторых лиц развивается аллергия. В запущенных случаях может развиваться «колтун» — запутывание и склеивание гнойно-серозными выделениями волос на голове, кожная поверхность покрывается корками, под которыми находится мокнущая поверхность.

Главная мера профилактики педикулёза — соблюдение правил личной гигиены!



В целях профилактики педикулеза необходимо:

- регулярно мыться;
- своевременно производить смену и стирку нательного и постельного белья, одежды;
- регулярно проводить уборку помещений;
- осуществлять регулярную стрижку и ежедневное расчесывание волос;
- помнить, что предметы личной гигиены, такие как расческа, полотенце являются сугубо индивидуальными.


Обязательному осмотру на педикулёз подлежат:

- дети, посещающие дошкольные образовательные организации, ежемесячно;
- учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных

организаций - 4 раза в год;

- дети, выезжающие на отдых в оздоровительные организации, - до отъезда;
- дети, находящиеся в детской оздоровительной организации, - еженедельно;
- больные, поступающие на стационарное лечение, - при поступлении и далее 1 раз в 7 дней;
- лица, находящиеся в организациях системы социального обеспечения, - 2 раза в месяц;
- амбулаторные больные - при обращении;
- работники организаций - при проведении диспансеризации и профилактических осмотров.

Меры борьбы с педикулезом



Если с вами все-таки случилась такая неприятность, как педикулёз, то не стоит отчаиваться и впадать в панику, а лучше своевременно обратиться в лечебное учреждение (поликлиника, кожно-венерологический диспансер) и начать лечение, не стоит прибегать к «бабушкиным» методам, таким как керосин или уксус. Ведь эти средства не только токсичны, но и обладают неприятным запахом и способны повредить кожу головы и волосы. К тому же, эти средства не имеют 100 % гарантии излечения.

Одновременно с обработкой от педикулеза необходимо произвести смену нательного и постельного белья с последующей стиркой, белье и верхнюю одежду нужно прогладить утюгом с отпариванием.